

গবাদি প্রাণীর টিকা এবং ব্যবহার বিধি

ক্র. নং	রোগের নাম	টিকার নাম	প্রাণী প্রজাতি ও টিকা প্রয়োগের বয়স	টিকার মাত্রা ও প্রয়োগ পথ	টিকার কার্যকাল	সংরক্ষণ	প্রতি মাত্রার মূল্য (টাকায়)	প্রতি ভায়ালের মূল্য (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ক্ষুরা রোগ	ট্রাইভ্যালেন্ট এফ.এম ডি টিকা	গরু/মহিষ - ৬মাস ছাগল/ভেড়া- ৩ মাস	গরুতে - ৬ মিলি, ছাগল/ভেড়ায় - ২ মিলি চামড়ার নীচে। ৬ মাস পর পর টিকা দিতে হবে। ট্রাইভ্যালেন্ট টিকার ক্ষেত্রে প্রথম টিকা প্রয়োগের ৪ সপ্তাহ পর বুস্টার ডোজ প্রয়োগ করতে হয়।	৬ মাস	৪° হতে ৮° সে. তাপে ৬ মাস	০.৫০	৫০.০০
২	তড়কা	তড়কা টিকা	গরু/মহিষ/ভেড়া- ২ বছর বা তদুর্ধ্ব	গরু, মহিষ - ১ মিলি; ছাগল,ভেড়া - ০.৫ মিলি চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হবে।	১ বছর	৪° হতে ৮° সে. তাপে ৬ মাস	০.৫৫	২৭.৫০
৩	বাদলা	বাদলা টিকা	গরু/মহিষ/ভেড়া/ছাগল- ৩ মাস থেকে ৩ বছর	গরু, মহিষ - ৫ মিলি; ছাগল,ভেড়া - ২ মিলি চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হবে।	৬ মাস	৪° হতে ৮° সে. তাপে ৬ মাস	১০.০০	১৬০.০০
৪	গলাফুলা	গলাফুলা টিকা	গরু/মহিষ- ৫ মাস বা তদুর্ধ্ব ছাগল/ভেড়া- ৩ মাস বা তদুর্ধ্ব	ক) অয়েল এডজুভেন্ট টিকাঃ গরু/মহিষ ২ মিলি (বয়স ২ বছরের উপরে) এবং ছাগল, ভেড়া, বাছুর ১ মিলি (বয়স ৬ মাস বা তদুর্ধ্ব), চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হবে। খ) এলাম অধঃপতিত টিকাঃ গরু/মহিষ ৫ মিলি এবং ছাগল, ভেড়া, বাছুর ২ মিলি মাংস প্রয়োগে করতে হবে।	১ বছর	৪° হতে ৮° সে. তাপে ৬ মাস	০.৫০	১০০.০০
৫	পি.পি.আর	পি.পি.আর টিকা	ছাগল/ভেড়া- ৩ মাস বা তদুর্ধ্ব	১০০সি.সি. ডাইল্যুয়েন্টের সাথে টিকা গুলানোর পর প্রতি প্রাণীকে ১ এম.এল করে চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হবে।	১ বছর	-২০° সে. তাপে ১ বছর -৫° হতে ০° সে. তাপে ৬ মাস ২° হতে ৮° সে. তাপে ১মাস	১.৫০	৩০.০০
৬	গোট ফক্স	গোট ফক্স টিকা	ছাগল/ভেড়া- ৬ মাস বা তদুর্ধ্ব	৫০সি.সি. ডাইল্যুয়েন্টের সাথে টিকা গুলানোর পর প্রতি প্রাণীকে ১ এম.এল করে চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হবে।	১ বছর	-২০° সে. বা তার কম তাপে ১ বছর ২° হতে ৮° সে. তাপে ১ মাস	০.৬০	৩০.০০
৭	জলাতংক	জলাতংক টিকা	বিড়াল/বেজি-১ মাসের বেশি কুকুর/গবাদি প্রাণী/বানর- ৩ মাস বা তদুর্ধ্ব	কুকুর ৩ মাসের কম বয়সী হলে ৩ মিলি HEP মাংসে প্রয়োগ করতে হয়। ১ মাস পর বুস্টার ডোজ। ৩ মাসের বেশি বয়সী হলে ৩ মিলি LEP মাংসে প্রয়োগ করতে হবে।	১ বছর	-২০° সে. বা তার কম তাপে ১ বছর ৮° সে. তাপে ৪৮ ঘন্টা	২৫.০০	২৫.০০

হাঁস-মুরগীর টিকা এবং ব্যবহার বিধি

ক্র. নং	রোগের নাম	টিকার নাম	প্রাণী প্রজাতি ও টিকা প্রয়োগের বয়স	টিকার মাত্রা ও প্রয়োগ পথ	টিকার কার্যকাল	সংরক্ষণ	প্রতি মাত্রার মূল্য (টাকায়)	প্রতি ভায়ালের মূল্য (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	মারেক্স	মারেক্স টিকা	বাচ্চা মুরগী ১ দিন বয়সে	২০০ সি.সি ডাইল্যুয়েন্টের সাথে গুলানোর পর ০.২ এম.এল মাংসে বা চামড়ার নীচে।	পূর্ণ জীবন	-২০° সে. তাপে ১ বছর -৫° হতে ০° সে. তাপে ৬ মাস	০.৩৫	৩৫০.০০
২	রানীক্ষেত	বাচ্চা মুরগীর রানীক্ষেত টিকা (বি.সি.আর.ডি.ডি)	৫-৭ দিন বয়স ও ২১ দিন বয়স	০৬ সি.সি ডিষ্টিলড ওয়াটারের সাথে মিশানোর পর মাত্র ১ ফোটা ১ চোখে।	৬-৮ সপ্তাহ	-২০° সে. তাপে ১ বছর -৫° হতে ০° সে. তাপে ৬ মাস ৪° হতে ৮° সে. তাপে ৪ মাস বরফসহ ফ্লাস্কে ১৫ দিন	০.১৫	১৫.০০
৩	পিজিয়ন পক্স	পিজিয়ন পক্স	কবুতর - ৫-৭ দিন বাচ্চা মুরগী ২-৭ দিন বয়সে	০৩ সি.সি ডিষ্টিলড ওয়াটারের সাথে মিশানোর পর বাইফারকেট নিডেল দ্বারা পাখার নিচে ১ ফোটা খুঁচিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।	১-৩ মাস	-২০° সে. তাপে ১ বছর -৫° হতে ০° সে. তাপে ৫ মাস	০.২০	২০.০০
৪	গামবোরো	বি.এ.ইউ ৪০৪	১০-২১ দিন বয়সে ১ম ডোজ এবং ৭ দিন পর ২য় ডোজ	৫০ সি.সি ডাইল্যুয়েন্টের সাথে মিশানোর পর মাত্র ১ ফোটা ১ চোখে।	পূর্ণ জীবন	৪° সে. এর নীচে	০.২০	২০০.০০
৫	ফাউল পক্স	ফাউল পক্স টিকা	২০ দিন বা তদুর্ধ	০৩ সি.সি ডিষ্টিলড ওয়াটারের সাথে মিশানোর পর বাইফারকেট নিডেল দ্বারা পাখার নিচে একাধিকবার খুঁচিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।	পূর্ণ জীবন	-২০° সে. তাপে ১ বছর -৫° হতে ০° সে. তাপে ৬ মাস ২° হতে ৮° সে. তাপে ১মাস	০.২০	৪০.০০
৬	বড় মুরগীর রানীক্ষেত (আর.ডি.ডি)	বড় মুরগীর রানীক্ষেত টিকা (আর.ডি.ডি)	২ মাস বা তদুর্ধ	১০০ সি.সি ডিষ্টিলড ওয়াটারের সাথে মিশানোর পর ১ এম.এল মাংসপেশীতে।	৬ মাস	-২০° সে. তাপে ১ বছর -৫° হতে ০° সে. তাপে ৬ মাস ৪° হতে ৮° সে. তাপে ৪ মাস বরফসহ ফ্লাস্কে ১৫ দিন	০.১৫	৩০.০০
৭	ফাউল টাইফয়েড/ সালমোনেলোসিস	ফাউল টাইফয়েড/ সালমোনেলা	৬-৮ সপ্তাহ ১ম ডোজ, ৪ সপ্তাহ পর ২য় ডোজ ৬ মাস পর বুস্টার ডোজ	০.৫ এম.এল চামড়ার নীচে।	৬ মাস	২° হতে ৮° সে. তাপে ৬মাস	০.৪৫	৯০.০০
৮	হাঁস-মুরগীর কলেরা	ফাউল কলেরা টিকা	২ মাস বয়সী হাঁস-মুরগী	ক) অয়েল এডজুভেন্ট টিকাঃ ১ এম.এল চামড়ার নীচে। ২১ দিন পর বুস্টার ডোজ। খ) এলাম অধঃপতিত টিকাঃ ১ এম.এল মাংস প্রয়োগ করতে হবে।	৬ মাস	২° হতে ৮° সে. তাপে ৬মাস	০.৩০	৩০.০০
৯	ডাকপ্লেগ	ডাক প্লেগ টিকা	৩ সপ্তাহ বা তদুর্ধ	১০০ সি.সি ডিষ্টিলড ওয়াটারের সাথে মিশানোর পর ১ এম.এল বুকের মাংসে।	৬ মাস	-৫° হতে ০° সে. তাপে ৬ মাস ৪° হতে ৯° সে. তাপে ১ মাস বরফসহ ফ্লাস্কে ৭ দিন	০.৩০	৩০.০০